


L'examen aura lieu le : _____ à _____

Directives pour le patient sur l'utilisation de PICO-SALAX^{MD}



Veillez suivre les directives ci-dessous, comme votre médecin vous l'a dit. Un laxatif particulier et puissant doit être pris un jour avant l'examen, et votre médecin vous a recommandé de prendre Pico-Salax que vous pouvez acheter à la pharmacie de votre quartier. Buvez une grande quantité de liquide clair comme de l'eau, du jus de pommes, du jus de raisin blanc, de la Gatorade, du thé ou du café noir pour aider à nettoyer votre intestin. **Vous devez être près d'une toilette après avoir pris le médicament, car il agit souvent très vite.**

Comment devez-vous prendre PICO-SALAX ?

- Vous devez prendre PICO-SALAX **le jour avant** d'avoir votre examen.
- Pendant que vous prenez PICO-SALAX, vous ne devez boire que des liquides clairs, sans couleur, (par exemple, de l'eau, de la Gatorade, du jus de raisin blanc, du jus de pommes ou du jus de canneberges clair, du soda au gingembre, du thé ou du café clair, du bouillon). Ne buvez pas de produits à base de lait ni de boissons qui ne sont pas transparentes.
- Il est important de boire un grand verre (250mL / 8 onces) d'eau ou autre liquide clair **à chaque heure** pendant que le médicament agit.

Le jour avant l'examen

- **Prenez le premier sachet de PICO-SALAX à _____.**
 - Videz le contenu du sachet dans une tasse.
 - Ajoutez 150 mL (4 onces) d'eau froide.
 - Remuez souvent pendant 2 à 3 minutes pour dissoudre tout le laxatif.
 - Si le mélange est un peu tiède, laissez-le refroidir avant de le boire. Continuez à le remuer pendant qu'il refroidit.
 - Buvez un grand verre (250 mL / 8 onces) d'eau ou un autre liquide clair à **chaque heure** pendant que le médicament agit.
- **Prenez le deuxième sachet de PICO-SALAX à _____.**
 - Suivez à nouveau les directives comme ci-dessus pour le premier sachet.

Le jour de l'examen

Buvez une petite quantité d'eau, si vous avez soif. Allez à l'hôpital/ou à la clinique.

Informations générales :

- 1) Vous devez arrêter de prendre les médicaments contenant de l'aspirine^{MD} (AAS), une semaine avant l'examen.
- 2) Vous devez arrêter de prendre les anticoagulants, comme Coumadin^{MD} (warfarine) une semaine avant l'examen – veuillez confirmer cela avec votre médecin.
- 3) Vous devez arrêter de prendre les pilules de fer, une semaine avant l'examen.
- 4) Vous devez arrêter de prendre Ticlid^{MD} (ticlopidine) et Plavix^{MD} (clopidogrel), quatre jours avant l'examen.

Directives particulières :



Toronto, (Ontario) M2J 5C1
1-800-263-4057

^{MD} Pico-Salax est une marque déposée de Ferring B.V.

^{MD} Aspirin est une marque déposée de Bayer AG

^{MD} Coumadin est une marque déposée de Bristol-Myers Squibb

^{MD} Ticlid et ^{MD} Plavix est les marques déposées de Sanofi-Aventis